

NAN EXPERTPRO A.R.

Livsmedel för speciella medicinska
ändamål för kostbehandling av
sjukdomsrelaterad reflux från födseln



- ✓ **Stärkelse**
För att förtjocka konsistensen
- ✓ **Mjölksyrabakterie L. reuteri**
- ✓ **Delvis hydrolyserat (nedbrutet) vassleprotein**
För att underlätta matsmältningen

APOTEKETS VNR. NAN® EXPERTPRO A.R. 226581



DOSERINGSTABELL*

Barnets ålder	Mängd kokt avvalnat vatten, ml	Mängd per mål:	
		Antal målstrukna mått*	Antal måltider per dygn***
1-2 veckor	90	3	6
3-4 veckor	120	4	5
2 månader	150	5	5
3-4 månader	180	6	5
5-6 månader**	210	7	5
7-9 månader	210	7	4-3
10-12 månader	210	7	3-2

Doseringsmått: 4,4 g. 100 ml = 13,2 g pulver + 90 ml vatten.

*Använd endast skopan i förpackningen. Måttvikt 4,4 g. För mycket pulver kan leda till uttorkning medan för lite pulver ger otillräcklig näring. Ändra inte förhållandet vatten/pulver utan att först konsultera läkare.

** Efter 6 månader är det dags att börja med en varierad kost. Rådgör med BVC.

*** Beroende på barnets behov. Barn äter olika mycket beroende på vikt och aktivitet. Tabellen är tänkt som en vägledning.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Förvara torrt, ej över normal rumstemperatur. Var noga med att återförsluta förpackningen efter användning.

OBS

Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella ändringar i ingredienslistan, så läs alltid etiketten på produkten.

PULVER

Öppnad förpackning, innehållet bör förbrukas inom 4 veckor. Produkten är förpackad i skyddande atmosfär för att bevara kvalitet och smak.

KONTRAINDIKATION: NAN EXPERTPRO A.R.

Ska inte användas vid diagnostiserad komjölksproteinallergi. NAN EXPERTPRO A.R. ska inte ges intravenöst.

Ett faktablad producerat av Nestlé Barnmat
för distribution under ansvar av barnhälsovården.

Tillagning



1. Tvätta händerna noggrant.
2. Rengör flaskan, nappen och locket noggrant. Sänk ner delarna helt under vatten, koka kraftigt och stäng av värmen. Förvaras övertäckt till nästa mål.
3. Koka dricksvatten kraftigt och stäng av värmen. Låt svalna till max 40 grader, för att bevara de levande mjölksyrabakterier.
4. Följ doseringstabellen och håll det avsvalnade vattnet i flaskan. Tillsätt sedan rätt antal strukna mått av pulver med endast den medföljande skopan, använd burkens innerkant för att försiktigt stryka av överflödigt pulver.
5. Sätt på napp med större flöde och skaka kraftigt. Först 5 sekunder framåt/bakåt och sedan 10 sekunder upp och ner. Se till att skopan är torr och förvara den i burken.
6. Tillslut förpackningen efter varje användning och förvara på sval och torr plats. Kontrollera temperaturen innan du matar barnet. Följ instruktionerna noga. Tillaga en flaska åt gången, mata direkt och släng resterna ut. Håll barnet när du matar så du ser att det inte sätter i halsen.*Om du använder en ångsterilisator, följ tillverkarens instruktioner.

VIKTIGT! Barnet kan bli sjukt av felaktig spädning och om vatten och flaska inte kokats. Riskera inte hälsan med felaktig lagring, beredning, matning. **VIKTIGT:** Bröstmjolk är den bästa maten för ditt barn. Rådgör med läkare eller dietist innan du ger ditt barn specialnäring. Lämplig som enda näringskälla från födseln eller som tillskottsnäring från 6 månaders ålder.

Kontakt

Ett faktablad producerat av Nestlé Barnmat för distribution under ansvar av barnhälsovården.

Kontakt: telefon 020-29 92 00
E-mail: barnmatsforum@se.nestle.com



För mer information,
besök vår hemsida:
www.nestlebaby.se
...eller scanna koden med
din mobil och läs mer.





Som hälsevårdspersonal kan du kontakta oss på:

www.nestlenan.se och nan@se.nestle.com

Nestlé Sverige AB Barnmatsforum, Box 7173, 250 07 Helsingborg

VIKTIGT: Vi anser att amning är den idealiska näringsstarten för spädbarn eftersom bröstmjölk ger barnet en balanserad kost och skydd mot sjukdomar. Vi stöder till fullo Världshälsoorganisationens rekommendation om exklusiv amning under de första sex månaderna av livet följt av introduktion av lämpliga näringsrika kompletterande livsmedel tillsammans med fortsatt amning upp till två års ålder. Vi är också medvetna om att amning kanske inte är ett alternativ på grund av vissa medicinska tillstånd. Du bör endast ge livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn under övervakning av en sjukvårdspersonal efter att ha övervägt alla matningsalternativ, inklusive amning. Fortsatt användning måste bedömas av sjukvårdspersonal i förhållande till barnets framsteg med hänsyn till eventuella sociala och ekonomiska konsekvenser för familjen.

Ett faktablad producerat av Nestlé Barnmat för distribution under ansvar av barnhälsovården.

Kontakt: telefon 020-29 92 00 **E-mail:** barnmatsforum@se.nestle.com

För mer information: www.nestlebaby.se