

NAN EXPERTPRO HA 2

Tillskottsnäring till spädbarn med ökad risk för atopisk dermatit, från 6 månader

PRODUKTBESKRIVNING

NAN EXPERTPRO HA 2 har kliniskt visat att reducera risken för atopisk dermatit¹. Är utvecklad på bakgrund av 15 kliniska studier och 3 meta-analyser^{1-3,6} som ett tillskott till, eller ersättning för bröstmjolk, när amning inte är möjlig eller tillräcklig. Produkten är ett komplement till barnets övriga kost, för ett anpassat näringsbehov för barn i åldern 6-12 månader.⁷

Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk (100% vassle, delvis hydrolyserat). Studier har visat sig att delvis hydrolyserat vassleprotein säkrar en bättre matsmältning och främjar en snabbare ventrikeltömning.⁴ 41% riskreduktion av atopisk dermatit upp till 20 års åldern⁵.

PROTEIN

100% vassleprotein, delvist hydrolyserat, som i studier har visat reducera risken för atopisk dermatit med 55% hos spädbarn¹

DESSUTOM

- Vegetarisk DHA från alger och ARA
- 1,6 ug D-vitamin per 100 ml färdigblandad NAN EXPERTPRO HA 2
- 1,0 mg järn per 100 ml färdigblandad NAN EXPERTPRO HA 2

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Bäst före utgången av:

Se botten. Öppnad förpackning bör förbrukas inom 4 veckor. Produkten är förpackad i skyddande atmosfär för att bevara kvalitet och smak.

OBS

Var uppmärksam på att produktsammansättningen kan ändras, läs alltid ingredienslistan på förpackningen innan du serverar ersättningen. 1 förpackning innehåller 800g som ger ca 5,8 L tillskottsnäring.



05/2026

INGREDIENSER

Laktos (mjölk), vegetabiliska oljor (solros, raps), delvis hydrolyserat **vassleprotein (mjölk)**, mineralämnen (natrium, kalium, kalcium, järn, magnesium, zink, jod, koppar, mangan, selen), olja från mikroalgen Schizochytrium sp., olja från Mortierella alpina, L-arginin, L-histidin, L-fenylalanin, vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, biotin, pantotensyra).

DOSERINGSTABELL **

Barnets ålder	Mängd per måltid Kokt avsvolat vatten (ml)	Mängd per måltid Antal strukna mått*	Antal måltider per dygn**
6 månader	210	7	5
7-9 månader	210	7	4-3
Från 10 mån.	210	7	3-2

*Använd bara skopan i förpackningen. För mycket pulver kan leda till uttorkning, medan för lite pulver ger otillräcklig näring. Förhållandet mellan vatten och pulver får inte ändras utan att först konsultera läkare. Doseringsmått à 4,6 g. 13,8 g + 90 ml vatten= 100 ml.

** Beroende på barnets behov.

TILLAGNING

1. Tvätta händerna noggrant.
2. Rengör noga flaska, napp och lock. Koka i 5 min. Förvaras övertäckt till nästa mål.
3. Koka vatten i några minuter, och låt svalna till ca. 40 °C.
4. Se doseringstabellen för barnets ålder. Fyll först flaskan med rätt mängd ljummet vatten. Tillsätt rätt antal strukna mått och använd endast medföljande skopa.
5. Tillslut förpackningen noga efter varje användning och förvara den torrt och svalt.
6. Sätt på locket och skaka ordentligt till allt pulver har lösts upp. Kontrollera temperaturen innan matning.
7. Intas omedelbart efter tillagning och kasta resterna.

Produkten är inte halal anpassad. Recept nr. DELWH126.

VIKTIGT!

Tillaga bara en flaska åt gången och följ instruktionerna noga. Mata direkt och släng resterna. Barnet kan bli sjukt om ersättningen blandas felaktigt, eller vid felaktig förvaring eller beredning, då detta potentiellt kan främja tillväxt av oönskade bakterier. Håll barnet när du matar så du ser att det inte sätter i halsen.

NESTLÉ STÖTTAR WHO KODEN

Vi anser att amning är den idealiska näringsmässiga starten för spädbarn och vi stöder till fullo Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendation om exklusiv amning under de första sex månaderna av livet följt av introduktion av lämpliga näringsrika kompletterande livsmedel tillsammans med fortsatt amning upp till två års ålder.

Vi är också medvetna om att amning inte alltid är ett alternativ för föräldrarna. Om föräldrarna överväger att inte amma bör vårdpersonalen informera föräldrarna om att ett sådant beslut kan vara svårt att ändra och att införandet av partiell flaskmatning kommer att minska tillgången på bröstmjölk. Föräldrarna bör överväga de sociala och ekonomiska konsekvenserna av att använda modersmjölksersättning. Modersmjölksersättning ska alltid beredas, användas och förvaras enligt anvisningarna på etiketten för att undvika risker för barnets hälsa.

REFERENSER

1. Alexander DD et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010;50(4):422-430.
2. Szajewska H et al. (Curr Med Res Opin. 2010;26(2):423-437).
3. Szajewska H et al. World Allergy Organ J. 2017;26:10(1):27.
4. Billeaud C, et al. Eur J Clin Nutr 1990;44:577-583.
5. Gappa M et al. Allergy 2021;76(6):1903-1907.
6. Von Berg A, et al. Allergy. 2016;71(2):210-9.
7. Lönnerdal B, et al. J Nutr Biochem. 2017; 41:1-11

NÄRINGSDEKLARATION

	Enhet	Per 100 g	Per 100 ml färdig NAN HA 2
Energi	kJ	2050	280
	kcal	490	67
Fett, varav	g	23	3,2
- mättat fett	g	2,2	0,3
- enkelomättat fett	g	15	2,0
- fleromättat fett	g	4,3	0,6
- linolsyra	mg	3500	479
- alfa-linolensyra	mg	300	41
- arakidonsyra	mg	123	17
- dokosaheksaensyra (DHA)	mg	123	17
Kolhydrater, varav	g	61	8,3
- sockerarter	g	61	8,3
- laktos	g	61	8,3
Protein, varav	g	9,3	1,3
- vassleprotein	g	9,3	1,3
Vitamin A	µg	420	57,4
Vitamin D	µg	12	1,6
Vitamin E	mg	12	1,6
Vitamin K	µg	37	5,0
Vitamin C	mg	70	9,6
Tiamin (B1)	mg	0,50	0,068
Riboflavin (B2)	mg	1,1	0,15
Niacin	mg	4,6	0,62
Vitamin B6	mg	0,36	0,049
Folsyra	µg	90	12,3
Vitamin B12	µg	1,3	0,18
Biotin	µg	12	1,7
Pantotensyra	mg	5,4	0,74
Natrium	mg	200	27
Kalium	mg	565	77,3
Klorid	mg	370	50,6
Kalcium	mg	505	69,1
Fosfor	mg	318	43,5
Magnesium	mg	50,0	6,84
Järn	mg	7,5	1,0
Zink	mg	3,7	0,51
Koppar	mg	0,38	0,052
Mangan	mg	0,12	0,016
Fluorid	mg	<0,06	< 0,008
Selen	µg	28	3,8
Jod	µg	98	13,4

Doseringsmåttet: 4,6 g. 100 ml = 13,8 g pulver + 90 ml vatten.