

ENDAST FÖR VÅRDPERSONAL

NAN EXPERTPRO HA 1

Modersmjölksersättning till spädbarn med ökad risk för atopisk dermatit, från 0 månader

PRODUKTBESKRIVNING

NAN EXPERTPRO HA 1 modersmjölksersättning som kliniskt visat att reducera risken för atopisk dermatit.¹ Täcker näringsbehovet från födsel upp till 6 månaders ålder. NAN EXPERTPRO HA 1 är utvecklad på bakgrund av 15 kliniska studier och 3 meta-analyser,^{1-3,6} som ett tillskott till, eller ersättning för bröstmjolk, när amning inte är möjlig eller tillräcklig.

Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk(100%vassle, delvist hydrolyserat vassleprotein). Studier har visat sig att delvis hydrolyserat vassleprotein säkrar bättre matsmältning och främjar en snabbare ventrikeltömning.⁴ 41% riskreduktion av atopisk dermatit upp till 20 års åldern.⁵

PROTEIN

100% vassleprotein, delvis hydrolyserat, som i studier har visat reducera risken för atopisk dermatit med 55% hos spädbarn.¹

DESSUTOM

- Vegetarisk DHA från alger och ARA
- 1,4 ug D-vitamin per 100 ml färdigblandad NAN EXPERTPRO HA1
- 0,7 mg järn per 100 ml färdigblandad NAN EXPERTPRO HA 1

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Bäst före utgången av: Se botten. Öppnad förpackning bör förbrukas inom 4 veckor. Produkten är förpackad i skyddande atmosfär för att bevara kvalitet och smak.

OBS

Var uppmärksam på att produktsammansättningen kan ändras, läs alltid ingredienslistan på förpackningen innan du serverar ersättningen. 1 förpackning innehåller 800 g som ger ca. 6,1 l modersmjölksersättning. NAN EXPERTPRO HA 1 finns också som 200 ml drickfärdig modersmjölksersättning.



08/2026

INGREDIENSER

Laktos (mjölk), vegetabiliskoljor (solros, raps), delvis hydrolyseratvassleprotein (mjölk), mineralämnen (natrium, kalium, kalcium, järn, magnesium, zink, jod, koppar, mangan, selen), olja från mikroalgen Schizochytrium sp., olja från Mortierella alpina, kolinbitartrat, L-arginin, L-histidin, L-fenylalanin, L-karnitin, inositol, taurin, vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), nukleotider (adenosin 5'-monofosfat, cytidin 5'-monofosfat, guanosin 5'-monofosfat, uridin 5'-monofosfat).

DOSERINGSTABELL **

Barnets ålder	Mängd per måltid Kokt avsvolnat vatten	Mängd per måltid Antal strukna mått*	Antal måltider per dygn**
1-2 veckor	90 ml	3	6
3-4 veckor	120 ml	4	5
Från 2 mån.	150 ml	5	5
3-4 månader	180 ml	6	5
5-6 månader	210 ml	7	5

*Använd bara skopan i förpackningen. För mycket pulver kan leda till uttorkning, medan för lite pulver ger otillräcklig näring. Förhållandet mellan vatten och pulver får inte ändras utan att först konsultera läkare. Doseringsmått å 4,4 g.

** Beroende på barnets behov.

TILLAGNING

1. Tvätta händerna noggrant.
2. Rengör noga flaska, napp och lock. Koka i 5 min. Förvaras övertäckt till nästa mål.
3. Koka vatten i några minuter, och låt svalna till ca. 40 °C.
4. Se doseringstabellen för barnets ålder. Fyll först flaskan med rätt mängd ljummet vatten. Tillsätt rätt antal strukna mått och använd endast medföljande skopa.
5. Tillsätt förpackningen noga efter varje användning och förvara den torr och svalt.
6. Sätt på locket och skaka ordentligt till allt pulver har lösts upp. Kontrollera temperaturen innan matning.
7. Intas omedelbart efter tillagning och kasta resterna.

Produkten är inte halal anpassad.

Recept nr. DENWH299

VIKTIGT!

Tillaga bara en flaska i taget och följ instruktionerna noggrant. Mata direkt och släng resterna. Barnet kan bli sjukt om ersättningen blandas felaktigt eller vid felaktig förvaring eller beredning, då detta potentiellt kan främja tillväxt av oönskade bakterier. Håll barnet när du matar, så du ser att det inte sätter i halsen.

VIKTIGT

Vi anser att amning är den idealiska näringsmässiga starten för spädbarn och vi stöder till fullo Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendation om exklusiv amning under de första sex månaderna av livet följt av introduktion av lämpliga näringsrika kompletterande livsmedel tillsammans med fortsatt amning upp till två års ålder.

Vi är också medvetna om att amning inte alltid är ett alternativ för föräldrarna. Om föräldrarna överväger att inte amma bör vårdpersonalen informera föräldrarna om att ett sådant beslut kan vara svårt att ändra och att införandet av partiell flaskmatning kommer att minska tillgången på bröstmjölk. Föräldrarna bör överväga de sociala och ekonomiska konsekvenserna av att använda modersmjölksersättning. Modersmjölksersättning ska alltid beredas, användas och förvaras enligt anvisningarna på etiketten för att undvika risker för barnets hälsa.

REFERENSER

1. Alexander DD et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010;50(4):422-430.
2. Szajewska H et al. Curr Med Res Opin. 2010;26(2):423-437.
3. Szajewska H et al. World Allergy Organ J. 2017;26:10(1):27.
4. Billeaud C, et al. Eur J Clin Nutr 1990;44:577-583.
5. Gappa M et al. Allergy 2021;76(6):1903-1907.
6. Von Berg A, et al. Allergy. 2016;71(2):210-9.

NÄRINGSDEKLARATION

	Enhet	Per 100 g	Per 100 ml färdig NAN HA1
Energi	kJ	2138	280
	kcal	511	67
Fett, varav	g	26	3,5
- mättat fett	g	2,4	0,3
- enkelomättat fett	g	17	2,2
- fleromättat fett	g	4,7	0,6
- linolsyra	mg	3800	498
- alfa-linolenolsyra	mg	330	43
- arakidonsyra	mg	130	17
- dokosaheksaensyra (DHA)	mg	130	17
Kolhydrater, varav	g	59	7,7
- sockerarter	g	59	7,7
- laktos	g	59	7,7
Protein, varav	g	9,7	1,3
- vassleprotein	g	9,7	1,3
Vitamin A	µg	440	57,7
Vitamin D	µg	11	1,4
Vitamin E	mg	12	1,6
Vitamin K	µg	37	4,8
Vitamin C	mg	70	9,2
Tiamin (B1)	mg	0,50	0,065
Riboflavin (B2)	mg	1,1	0,14
Niacin	mg	4,9	0,64
Vitamin B6	mg	0,36	0,047
Folsyra	µg	90,0	11,8
Vitamin B12	µg	1,4	0,18
Biotin	µg	13	1,6
Pantotensyra	mg	5,4	0,71
Natrium	mg	190	25
Kalium	mg	635	83,8
Klorid	mg	395	51,8
Kalcium	mg	336	44,1
Fosfor	mg	186	24,4
Magnesium	mg	50,0	6,56
Järn	mg	5,4	0,71
Zink	mg	3,8	0,50
Koppar	mg	0,37	0,049
Mangan	mg	0,12	0,015
Fluorid	mg	<0,06	< 0,01
Selen	µg	28	3,6
Jod	µg	103	13,5
Taurin	mg	29	3,8
Kolin	mg	175	23
Inositol	mg	34	4,5
L-karnitin	mg	12	1,5
Nukleotider	mg	15	2,0

Doseringsmåttet: 4,4g. 100ml=13,2pulver + 90ml vatten

mdr/år